Pacientes con algún trastorno depresivo, en el Servicio de Preconsulta 2007-2009

Durante el periodo comprendido de enero de 2007 a marzo de 2009 se atendieron a 4,648 pacientes a los que se les diagnosticó algún trastorno depresivo, esta cifra representa la incidencia de pacientes con este tipo de diagnóstico en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. La distribución de estos pacientes por Diagnóstico, sexo y grupo de edad se presenta en las siguientes tablas.

Durante el periodo 2007 se atendieron un total 1,718 de pacientes en episodio depresivo sobresale la Depresión moderada con un total de 868 pacientes que corresponde al 50.5% atendidos en el periodo, en el trastorno depresivo recurrente aparece nuevamente la depresión moderada con el 38.6 % que corresponde a 664 pacientes.

En el periodo 2008 se atendieron un total 2,390 con el 39 % más que durante el 2007. En episodio depresivo sobresale la Depresión Moderada con un total de 1,474 pacientes que corresponde al 61.1 % atendidos en el periodo, en el trastorno depresivo recurrente aparece nuevamente la depresión moderada con el 26.9 % que corresponde a 643 pacientes.

En el primer trimestre del periodo 2009 se han atendido total 540 tendencia que guarda con el primer trimestre 2008. En episodio depresivo sobresale la Depresión Moderada con un total de 334 pacientes que corresponde al 61.9 % atendidos en el periodo, en el trastorno depresivo recurrente aparece nuevamente la depresión moderada con el 17.4 % que corresponde a 94 pacientes.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES POR TIPO DE DEPRESIÓN, SEXO Y GRUPO DE EDAD, EVALUADOS EN LA PRECONSULTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSULTA EXTERNA DE 2007 A 2009

Durante el periodo reportado se han atendido un total de 4,648 pacientes con diagnóstico de depresión correspondiendo el 72.9 % a pacientes mujeres atendidas de las cuales el grupo de mayor incidencia se encuentra entre 30 a 40 años.
En relación a los pacientes hombres el grupo de edad más afectado se encuentra entre el 30 y 49 años de edad.

En relación a los pacientes atendido se observa que de los 4,648 pacientes con diagnostico depresión en el 79.3 %de los casos, los pacientes NO CUENTAN con NINGUN tipo de seguridad social, así también la entidad federativa de procedencia de los pacientes atendidos con este diagnóstico corresponde en un 81% a Distrito Federal.

Por último de los 4,648 pacientes con diagnóstico de depresión se abrió expediente a un total de 3,374 correspondiente al 81%.

Conclusiones:

1.- Como se observa en el periodo reportado durante el 2007 y el primer trimestre 2009 el sexo que predomina de los 4,648 pacientes con diagnóstico de depresión es el 72.9 % a pacientes mujeres, el grupo de edad más afectado se encuentra entre los 30 a 49 años. Datos similares a los reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2. En episodio depresivo sobresale la Depresión Moderada entre el 50 y 69% de los casos atendidos.

3.- Es importante señalar que en el 79.3 % de los casos atendidos con diagnóstico de depresión en sus diferentes tipos la población atendida NO CUENTA CON NINGÚN TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL (cumpliendo así con la Ley de Institutos Nacionales de Salud). En relación a la entidad federativa de procedencia el 81% es del Distrito Federal.

Distribución de los pacientes por tipo de depresión, sexo y grupo de edad. Evaluados en la Pre-consulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009.

DX CIE 10		Grupo de Edad (Norma DGIS-SSA)													
		10-14		15-19		20-29		30-49		50-59		60 y más		Total	
		Mujeres													
Episodio depresivo															
F32.0	Leve	11	13.1%	25	6.8%	70	7.2%	82	5.8%	15	4.2%	10	4.7%	213	6.3%
F32.1	Moderado	56	66.7%	228	62.3%	521	53.9%	762	54.2%	188	52.7%	135	63.1%	1890	55.7%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos			5	1.4%	19	2.0%	21	1.5%	4	1.1%	1	0.5%	50	1.5%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos			3	0.8%	6	0.6%	7	0.5%	1	0.3%			17	0.5%
F32.9	No especificado	1	1.2%	2	0.5%	12	1.2%	7	0.5%	2	0.6%	1	0.5%	25	0.7%
Trastorno depresivo recurrente															
F33.0	Leve	2	2.4%	10	2.7%	14	1.4%	28	2.0%	6	1.7%	1	0.5%	61	1.8%
F33.1	Moderado	13	15.5%	90	24.6%	308	31.9%	474	33.7%	138	38.7%	64	29.9%	1087	32.0%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	1	1.2%	1	0.3%	12	1.2%	16	1.1%			1	0.5%	31	0.9%
F33.3	Grave con síntomas psicóticos			2	0.5%	3	0.3%	7	0.5%			1	0.5%	13	0.4%
F33.9	No especificado					1	0.1%	2	0.1%	3	0.8%			6	0.2%
Total Mujeres		84		366		966		1406		357		214		3393	100.0%
		Hombres													
Episodio depresivo															
F32.0	Leve	4	6.9%	22	13.0%	33	8.8%	25	5.2%	3	2.8%	4	5.9%	91	7.3%
F32.1	Moderado	44	75.9%	106	62.7%	248	66.0%	280	58.6%	63	59.4%	43	63.2%	784	62.5%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos			2	1.2%	6	1.6%	12	2.5%	2	1.9%	1	1.5%	23	1.8%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos							5	1.0%					5	0.4%
F32.9	No especificado			3	1.8%	8	2.1%	1	0.2%	1	0.9%		0.0%	13	1.0%
Trastorno depresivo recurrente															
F33.0	Leve	1	1.7%	3	1.8%	2	0.5%	7	1.5%	3	2.8%		0.0%	16	1.3%
F33.1	Moderado	8	13.8%	32	18.9%	77	20.5%	144	30.1%	33	31.1%	20	29.4%	314	25.0%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	1	1.7%	1	0.6%	2	0.5%	3	0.6%					7	0.6%
F33.3	Grave con síntomas psicóticos									1	0.09%			1	0.1%
F33.9	No especificado							1	0.2%					1	0.1%
Total Hombres		58		169		376		478		106		68		1255	100.0%
Total General		142		535		1342		1884		463		282		4648	



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009

Distribución de los pacientes por tipo de depresión, año y trimestre. Evaluados en la Pre-consulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009.

DX CIE 10		Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Total	
		2007									
Episodio depresivo											
F32.0	Leve	7	1.8%	24	6.1%	27	5.2%	8	1.9%	66	3.8%
F32.1	Moderado	221	57.7%	229	58.0%	214	41.3%	204	48.3%	868	50.5%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos	5	1.3%	10	2.5%	14	2.7%	7	1.7%	36	2.1%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos	4	1.0%	1	0.3%	4	0.8%	1	0.2%	10	0.6%
F32.9	No especificado	1	0.3%	7	1.8%	6	1.2%	3	0.7%	17	1.0%
Trastorno depresivo recurrente											
F33.0	Leve	1	0.3%	6	1.5%	6	1.2%	4	0.9%	17	1.0%
F33.1	Moderado	140	36.6%	109	27.6%	232	44.8%	183	43.4%	664	38.6%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	2	0.5%	4	1.0%	12	2.3%	10	2.4%	28	1.6%
F33.3	Grave con síntomas psicóticos	1	0.3%	3	0.8%	2	0.4%	2	0.5%	8	0.5%
F33.9	No especificado	1	0.3%	2	0.5%	1	0.2%			4	0.2%
Total 2007		383		395		518		422		1718	100.0%
		2008									
Episodio depresivo											
F32.0	Leve	16	2.7%	30	5.1%	90	15.1%	30	5.0%	166	6.9%
F32.1	Moderado	360	60.6%	362	60.9%	385	64.6%	365	60.2%	1472	61.6%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos	6	1.0%	9	1.5%	5	0.8%	6	1.0%	26	1.1%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos	2	0.3%	5	0.8%	3	0.5%	1	0.2%	11	0.5%
F32.9	No especificado	7	1.2%	1	0.2%	4	0.7%			12	0.5%
Trastorno depresivo recurrente											
F33.0	Leve	9	1.5%	10	1.7%	5	0.8%	19	3.1%	43	1.8%
F33.1	Moderado	191	32.2%	175	29.5%	99	16.6%	178	29.4%	643	26.9%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos			1	0.2%	2	0.3%	5	0.8%	8	0.3%
F33.3	Grave con síntomas psicóticos	1	0.2%	1	0.2%	3	0.5%	1	0.2%	6	0.3%
F33.9	No especificado	2	0.3%					1	0.2%	3	0.1%
Total 2008		594		594		596		606		2390	100.0%

		2009	
Episodio depresivo			
F32.0	Leve	72	13.3%
F32.1	Moderado	334	61.9%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos	11	2.0%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos	1	0.2%
F32.9	No especificado	9	1.7%
Trastorno depresivo recurrente			
F33.0	Leve	17	3.1%
F33.1	Moderado	94	17.4%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	2	0.4%
F33.3	Grave con síntomas psicóticos		
F33.9	No especificado		
Total 2009		540	100.0%



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009

Distribución de los pacientes por tipo de depresión y entidad federativa de residencia. Evaluados en la Pre-consulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009.

DX CIE 10		Entidad Federativa					
		Distrito Federal		Estado de México		Otras Entidades	
Episodio depresivo							
F32.0	Leve	245	6.4%	56	7.4%	3	3.4%
F32.1	Moderado	2197	57.7%	418	55.6%	59	67.8%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos	57	1.5%	14	1.9%	2	2.3%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos	16	0.4%	5	0.7%	1	1.1%
F32.9	No especificado	29	0.8%	7	0.9%	2	2.3%
Trastorno depresivo recurrente							
F33.0	Leve	63	1.7%	13	1.7%	1	1.1%
F33.1	Moderado	1154	30.3%	228	30.3%	19	21.8%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	30	0.8%	8	1.1%		
F33.3	Grave con síntomas psicóticos	12	0.3%	2	0.3%		
F33.9	No especificado	6	0.2%	1	0.1%		
Total Entidades		3809		752		87	



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009

Distribución de los pacientes por tipo de depresión y si se les abrió expediente.
Evaluados en la Pre-consulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009.

DX CIE 10		Pacientes que solo asistieron a Preconsulta		Pacientes a los que se les integró expediente	
Episodio depresivo					
F32.0	Leve	151	17.3%	153	4.1%
F32.1	Moderado	415	47.5%	2259	59.9%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos	26	3.0%	47	1.2%
F32.3	Grave con síntomas psicóticos	9	1.0%	13	0.3%
F32.9	No especificado	14	1.6%	24	0.6%
Trastorno depresivo recurrente					
F33.0	Leve	38	4.3%	39	1.0%
F33.1	Moderado	197	22.5%	1204	31.9%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	20	2.3%	18	0.5%
F33.3	Grave con síntomas psicóticos	3	0.3%	11	0.3%
F33.9	No especificado	1	0.1%	6	0.2%

Total	874	3774



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009

Distribución de los pacientes por tipo de depresión y nivel socioeconómico asignado de aquellos que se les abrió expediente.
Evaluados en la Pre-consulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009

DX CIE 10		Nivel Socioeconómico													
		Exento		Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Nivel 4		Nivel 5		Nivel 6	
Episodio depresivo															
F32.0	Leve			9	3.5%	33	3.3%	59	4.3%	11	3.7%	39	4.7%	2	8.0%
F32.1	Moderado	9	64.3%	144	56.5%	600	60.1%	813	59.9%	170	56.5%	507	61.6%	16	64.0%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos			8	3.1%	19	1.9%	16	1.2%	2	0.7%	2	0.2%		
F32.3	Grave con síntomas psicóticos			4	1.6%	5	0.5%	3	0.2%			1	0.1%		
F32.9	No especificado			1	0.4%	4	0.4%	5	0.4%	4	1.3%	9	1.1%	1	4.0%
Trastorno depresivo recurrente															
F33.0	Leve			4	1.6%	7	0.7%	16	1.2%	5	1.7%	7	0.9%		
F33.1	Moderado	5	35.7%	81	31.8%	317	31.7%	435	32.1%	105	34.9%	255	31.0%	6	24.0%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos			2	0.8%	8	0.8%	5	0.4%	1	0.3%	2	0.2%		
F33.3	Grave con síntomas psicóticos			2	0.8%	5	0.5%	3	0.2%	1	0.3%		0.0%		
F33.9	No especificado					1	0.1%	2	0.1%	2	0.7%	1	0.1%		
Total Nivel Socioeconómico		14		255		999		1357		301		823		25	



Fuente: INPRFM, Dirección de Servicios Clínicos, junio 2009

NOTA: La elevación del nivel cinco se explica porque este nivel se asigna a los pacientes con seguridad social

Distribución de los pacientes por tipo de depresión y si se les abrió expediente.
Evaluados en la Pre-consulta de la Subdirección de Consulta Externa de 2007 a 2009.

DX CIE 10		Seguridad Social							
		IMSS		ISSSTE		NINGUNA		OTRA	
Episodio depresivo									
F32.0	Leve	39	5.8%	18	6.3%	247	6.7%		
F32.1	Moderado	397	59.4%	168	58.9%	2105	57.1%	4	66.7%
F32.2	Grave sin síntomas psicóticos	9	1.3%	4	1.4%	60	1.6%		
F32.3	Grave con síntomas psicóticos	1	0.1%	1	0.4%	20	0.5%		
F32.9	No especificado	11	1.6%	1	0.4%	26	0.7%		
Trastorno depresivo recurrente									
F33.0	Leve	8	1.2%	6	2.1%	63	1.7%		
F33.1	Moderado	198	29.6%	84	29.5%	1117	30.3%	2	33.3%
F33.2	Grave sin síntomas psicóticos	4	0.6%	1	0.4%	33	0.9%		
F33.3	Grave con síntomas psicóticos					14	0.4%		
F33.9	No especificado	1	0.1%	2	0.7%	4	0.1%		

Total Seguridad Social	668	285	3689	6